## Divisão e expansão da crista do rebordo em duas etapas para instalação de implantes na região mandibular posterior

A two-step, split crest technique at posterior mandible for implant placement - case report









Imprimir Indique a um amigo

## Autor(es):

Alexander Rudolf Höhn\* Remo Rabêllo Mesquita Filho\*\* Joana Araújo\*\*\* Ana Carolina de Araújo Ganimi\*\*\*\*

\*Mestre e especialista em Implantodontia e coordenador dos Cursos de Especialização em Implantodontia - ABO/RJ, ABO/RJ-Sucursal Barra da Tijuca e ABO/Teresópolis/RJ, \*\*Especialista em Implantodontia e professor dos Cursos de Especialização em Implantodontia - ABO/RJ-Sucursal Barra da Tijuca, ABO/Teresópolis/RJ e UniFoa-Volta Redonda/RJ. \*\*\*Aluna do Curso de Especialização em Implantodontia - ABO/RJ-Sucursal Barra da Tijuca. \*\*\*\*Aluna do Curso de Especialização em Implantodontia -ABO/RJ-Sucursal Barra da Tijuca.

## Resumo:

A reabilitação da região posterior da mandíbula atrófica com implantes osseointegráveis é um grande desafio. Os padrões de reabsorção pós-exodontia modificam significativamente a largura e a altura do rebordo ósseo residual. Diferentes técnicas iá foram propostas para o tratamento de mandíbulas severamente reabsorvidas. A técnica de divisão e expansão da crista na mandíbula não é controlável devido a grande espessura das corticais ósseas, causando o desprendimento total do bloco ósseo. Uma abordagem técnica em duas etapas na mandíbula é indicada para evitar complicações, diminuindo-se assim à taxa de insucesso sem, no entanto, causar um atraso significante no tratamento.